

Formation N2

# Physique : Dalton, Appareil ventilatoire, circulatoire échanges gazeux

- Formation Niveau 2
- Durée : 60 minutes


## Pourquoi ?

## Prérequis

- Mariotte ( $P_1V_1 = P_2V_2$ )
- Ballon gonflé avec 1l d'air à 40m → quel volume en surface ?
- → 5l en surface (5bar à 40m, 1bar en surface)

## Prérequis

Évolution du volume par rapport à la profondeur



## Dalton

“La pression totale d'un mélange gazeux est égale à la somme des pressions partielles des gaz constituants ce mélange”

## Expérience de Berthollet

- Soit deux bouteilles pleines
- de 100% d'O<sub>2</sub> pour l'une et 100% de N<sub>2</sub> pour l'autre.
- La pression est de 1bar dans chaque bouteille.

## Expérience de Berthollet

- On relie les deux bouteilles
- On ouvre les robinets on patiente ...
- On analyse ensuite le mélange
  - 1 bar de pression dans chaque bouteille
  - 50% d'O<sub>2</sub> et 50% de N<sub>2</sub> !
  - la pression partielle d'O<sub>2</sub> est de 0,5 bar, celle de N<sub>2</sub> aussi
  - 0,5+0,5 = 1 !

## Dalton


- Quelle est la composition de l'air ?
- Quelle est donc la pression partielle de l'azote dans l'air ?
- On descend à 20m, quelle est la pression absolue ?
- Quelle est la pression de l'azote qu'on respire à 20m ?
- Je plonge à l'air et la ppo<sub>2</sub> est de 1,6 bar, à quelle profondeur je suis ?

$P_a = 1.6 / 21\% = 7.6 \text{ bar}$  soit 66m


## Henry

“À pression constante et à saturation, la quantité de gaz dissoute dans un liquide est proportionnelle à la pression exercée par ce gaz sur le liquide”

Cette pression est appelée Tension



**Lors de la descente**



**Au bout d'un certain temps à profondeur constante**

Environnement  
 $P_p > T$



saturation

Lors de la remontée

Environnement  
 $P_p < T$



sur saturation

Lors d'une remontée trop rapide

Environnement  
 $P_p \ll T$



sur saturation critique

C'est la sur-saturation critique : le gaz dissous repasse sous forme gazeuse et passe par ou il peut !

## Résumé

- état stable : saturation
- sous-saturation : lors de la descente
- sur-saturation : quand on monte
- le délais de saturation dépends de différents facteurs
  - nature du gaz (azote)
  - nature du liquide/tissu (corps)
  - température
  - pression / tension (profondeur)
  - surface de contact (vascularisation)
  - agitation (effort)


## Appareil ventilatoire

- Permet d'aller capturer l'oxygène de l'air (O<sub>2</sub>)
- Et de relâcher les déchets (CO<sub>2</sub>)
- C'est là que se réalisent les échanges gazeux (sauf add)
- D'un côté du gaz (l'air) et de l'autre un liquide (sang)
- C'est le seul endroit ou un gaz peut se dissoudre dans le sang pour entrer dans notre corps

## Vue Globale



## Détail des alvéoles pulmonaires



## Appareil circulatoire

- La source de vie (oxygène)
- Un liquide comme support de transport (le sang)
- Un réseau pour le diffuser "des tuyaux" (artères, veines)
- Une pompe (le coeur)
- Des capteurs (en particulier de CO<sub>2</sub> au niveau de la carotide)

## La grande circulation

- C'est le grand réseau
- Le sang s'enrichit en oxygène au niveau des poumons
- Il est ensuite envoyé dans tout le corps via les artères
- Les cellules captent l'O<sub>2</sub> et rejettent du CO<sub>2</sub>
- Le sang pauvre en O<sub>2</sub> (et riche en CO<sub>2</sub>) est ramené aux poumons via les veines

## La petite circulation

- C'est uniquement la partie Coeur ↔ Poumons
- Amène par l'artère pulmonaire le sang veineux (pauvre en O<sub>2</sub>)
- Au contact des alvéoles pulmonaires il se réoxygène totalement

- Puis renvoyer ce sang au cœur par les veines pulmonaires
- Aide mémoire:
  - Artères: du coeur vers autre organe
  - Veines: vers le coeur

## Narcose

- Lié à l'azote
- Communément admis à partir de 30m
- Moins pour certaines personnes / certaines situations
- Ralentissement de l'influx nerveux
- Baisse des capacités mentales & cognitives

## Facteurs favorisant la narcose

- Profondeur
- Froid, visibilité
- Vitesse de descente
- Position durant la descente
- Fatigue
- Condition physique
- Habitude
- Médicaments
- Efforts

## Narcose : quel ressenti

- Manque d'attention / de concentration
- Raisonnement altéré
- La mémoire immédiate (vérification du mano toutes les 20 secondes)
- Effet tunnel, trouble de la vision
- Amplification des sensations (euphorie, angoisse)

## Narcose : conduite à tenir

- Assistance
- Remonter, quelques mètres suffisent

## Toxicité des gaz

- $0.17 < PPO_2 < 1.6$  bar (66 m)
- $PPN_2 < 5.4$  bar (à 60m)
- $CO_2$  : danger dès que le taux augmente trop

## Hyperoxie

## Hypercapnie

## Hypoxie

## Monoxyde de carbone

## Essoufflement

- Lié à une mauvaise évacuation du CO2
- Effort
- Aisance technique
- Stress
- Froid
- Matériel

## Mécanisme de l'essoufflement

- Réflexe inspiratoire
- Alors qu'il faut au contraire expirer le plus possible
- Augmentation de la fréquence d'inspiration
- Augmentation du taux
- Boucle infernale

## Essoufflement - Prévention

- Ne pas s'immerger si on est déjà en manque d'air
- Pas d'effort en profondeur
- Bon équilibrage, bon lestage
- Suivre sa consommation
- Forme physique

## Essoufflement - Conduite à tenir

- Cesser tout effort
- Informer ses coéquipiers
- Remonter
- Augmenter les paliers s'il y en avait
- Attention au risque de panique
- Risque de panne d'air

## Apnées

## Résumé

Source:

<https://formation.ppo2.fr/> - **Espace formation ppo2**

Lien direct:

<https://formation.ppo2.fr/niveau2/physique?rev=1547840589>

Dernière mise à jour: **2019/01/18 20:43**

